

Marteloscopio Dehesa de Valsalobre



Monte “Dehesa Boyal de Valsalobre”

El monte de utilidad pública “Dehesa Boyal de Valsalobre” está situado al norte de la Serranía de Cuenca, en la cuenca alta del río Tajo.

Presenta pendientes suaves (<10%) y exposiciones sur y oeste, sin apenas representación de la orientación norte. Las temperaturas son muy extremas debido al efecto de la continentalidad, con una amplitud térmica anual superior a 20° C.

Se trata de un monte de pequeñas dimensiones en el que en menos de 400 ha aparecen formaciones adehesadas, pastizales, pinares naturales con varias especies y reforestaciones en distintos estados de desarrollo.

Tradicionalmente aprovechada para pastos, el aprovechamiento forestal de dicha dehesa se limitaba a la extracción de leñas de pies secos de pino y podas de quejigo. Como consecuencia del abandono del campo y la despoblación este uso ha desaparecido, siendo actualmente los aprovechamientos existentes el maderero, el ganadero (bovino) y el cinegético (jabalí, ciervo, gamo y corzo).




- Matorral y pastizal
- Masa mixta de quejigar y pinar
- Quejigar adehesado
- Pinar (P. nigra y P. sylvestris)
- Inforestal

352 ha	66,5 m³/ha	141 m³	8,5 €/ha	45 %	1,6 €/ha	0,4 UGM/ha
Área total del monte	Volumen con corteza	Posibilidad anual del pinar (madera)	Ingresos anuales madera	coníferas	Ingresos anuales por el arrendamiento del aprovechamiento de pastos	Carga ganadera
127 pies/ha	0,8 m³/ha	100 estéreos	38,5 m/ha	55 %	5,2 €/ha	
Densidad de árboles	Crecimiento anual	Posibilidad anual del quejigar (leñas)	Densidad red viaria	frondosas	Ingresos anuales por el arrendamiento del aprovechamiento cinegético	

Gestión forestal y biodiversidad

La práctica totalidad del monte se encuentra incluido en el ZEC y ZEPA “Serranía de Cuenca”. Es considerado un rodal de referencia para el tipo de hábitat de interés comunitario 9240 “Robledales ibéricos de *Quercus faginea* y *Quercus canariensis*” dentro del proyecto LIFE RED BOSQUES, por ser el rodal que mejores características de madurez alberga para este tipo de hábitat. También se trata de un monte con gran riqueza de quirópteros, registrándose 16 especies diferentes.




97,4 %	2-3 pies/ha
del monte en espacios protegidos	Objetivo de árboles muertos en el monte
24	4
especies de aves	especies de insectos saproxílicos



Accipiter gentilis



Pieris ergane



Lucanus cervus



Vipera latastei



Lysandra caelestissima




Nyctalus lasiopterus

Condiciones del lugar

Coordenadas (X,Y)*:	573.403, 4.497.675
Tipo de bosque:	Masa mixta de P. nigra, P. sylvestris y Q. faginea.
Suelo:	Inceptisols (grupo Xerochrept).
Litología:	Areniscas blanco amarillentas, conglomerados y arcillas.
Altitud:	1347 m.s.n.m.
Temperatura media anual:	12 °C.
Precipitación anual:	785 mm.
Precipitación estival:	125,9 mm.
Periodo medio de sequía:	2 meses (julio y agosto).

Datos de la masa



N (pies/ha)	279
AB (m²/ha)	24,2
Volumen (m³/ha)	122,5
Valor ecológico (puntuación)	5848
Valor económico (€)	5287
Madera muerta en pie (m³/ha)	1,3
Madera muerta en suelo (m³/ha)	5,3

Mapa del marteloscopio

